



ben kihat a fiókák jó fejlődésére, ezúton is csak ajánlani tudom, aki teheti, termelje meg

magának a madarai számára szinte nélkülözhetetlen csuizt, napraforgót... és mindezt féltetlen *(tejesen)* kínálja kedvenceinek, az eredmény nem fog elmaradni!

**Szoktad-e megméretetni a madaraidat, szoktál-e részt venni a kiállításokon?**

Hosszú évek óta tagja vagyok a szabadkai kisállattenyésztők – madarász szakosztályának –, és természetesen szoktam kiállításra is küldeni a madaraimat. Az elmúlt néhány évben több szép sikert értem el, úgy helyi, mint országos szinten is. A 2008-as belgrádi országos bajnokságon a rubin rozellám a második helyet érdemelte

ki és a szakosztályon belüli versenyben is összesítettben második lettem!

**Zárásul csak annyit, aki Szabadkán jár, ne hagyja ki, hogy meglátogassa Lacit, mert gyönyörű környezetben, gyönyörű madarak között tölthet el csodás perceket!**

Szakosztályunk elérhetősége:

www.sekcij-pticara.rs

Elérhetőség: Deák László Viroviticka 2


2400 Subotica-Serbia

Tel.: 024 -535-459 \* Gyűrűszám -SRB-22-25

Írta: Tomek Róbert

E-mail: rtomek@sksyu.net

## A GOULD AMANDINA SZAPORÍTÁSA



6 napos fiókák

A Gould amandina szaporítása nem túl könnyű feladat, de ha a tartásában már megfelelő tapasztalatot szereztünk és rendelkezünk egy megfelelő párral, akkor bátran vágjunk bele. Nagyon fontos, hogy minden információt beszerezzünk a madarak tartásáról, tenyésztéséről, és legjobb tudásunk szerint biztosítsuk a körülményeket a költésre kiszemelt párnak számára. Alapfeltétel a legalább egyéves *(ezt mindenképpen*

*tartsuk be)*, nem egy fészekaljából való, összeálló, egészséges és a vedlést teljesen befejezett két madár.

A Gould amandina röpdében és kalitkában egyaránt szaporítható. Én az egy kalitka, egy költőpár elvet tartom a legjobbnak, de nem vitatom, hogy röpdében akár több pár együtt is sikeresen tenyészthető.

Vásárláskor, választáskor érdemes előre gondolni arra, hogy szeretnénk-e szaporulatot, vagy csak szépségükért tartjuk madarainkat. Amennyiben fiókákat akarunk nevelni, érdemes eldönteni, hogy milyen színváltozatot vagy színváltozatokat kívánunk szaporítani. Ha egy színváltozatot kedvelünk és a fiókákat is szeretnénk, hogy ilyenek legyenek, akkor vásárláskor érdemes megnézni, hogy az eladó vegyesen vagy színek szerint tudatosan elkülönítve tenyészti-e madarait. Én is saját tapasztalatomból tanultam meg, hogy ha a szülők ismerete nélkül, kezdő Gould amandina tartóként vásárolt, két tisztán fekete fejű vérvonalat képviselőnek hitt madarat párba állítunk, azoknak könnyen lehetnek piros fejű fiókái, hiszen a korábbi nemzedékek tulajdonságait nem ismerjük.

Amennyiben sikerült beszerezni a megfelelő madarakat, melyek megszokták a he-



A 8 napos fiókákon már megjelentek az első szárnytollak



18 napos kitollasodott fiókák, melyek 1-2 nap múlva kirepülnek a fészekből



16 napos fiókák



A tojások

lyüket és jó kondícióba kerültek, akkor a következő lépés az odú felhelyezése. A madarak csőrének színe elárulja, hogy felkészültek a költésre. A hímek csőre fehér lesz piros véggel, a tojók csőre pedig szinte teljesen befeketedik.


Tapasztalatom szerint azokat az odúkat szeretik legjobban, melyeknek nyílása 9-10 cm magasan van és alapterülete 15x15cm. A nyílás magassága 6-7cm, függetlenül attól, hogy kerek vagy szögletes az alakja.

# KÖNYVAJÁNLÓ



Georg A. Radtke

## A hullámos papagáj



- Kiválasztás
- Elhelyezés, gondozás
- Helyes táplálás
- Betegségek megelőzése



**1.180 Ft + postaköltség**

A KÖNYV MEGRENDELHETŐ  
A DÍSZMADÁR MAGAZIN  
SZERKESZTŐSÉGÉNEK CÍMÉN:  
MG Bt. 9700 Szombathely,  
Vörösmarty M. u. 34.  
T./F.: 94/313-824, [www.mgbt.hu](http://www.mgbt.hu)  
E-mail: [mgbt@vivamail.hu](mailto:mgbt@vivamail.hu)

## DÍSZMADARAKRÓL

*egzóták, díszpintyek,  
kanárik, kis-közép  
és nagypapagájok*  
ismeretterjesztő anyagok,  
mely neves tenyésztőknél,  
hazai és külföldi  
kiállításokon készült több  
mint 80 órás felvételből  
igény és érdeklődési kör  
szerinti összeállításban  
(180 perc) DVD-n vagy VHS  
kazettán kedvező áron  
megrendelhető,  
utánvétellel is.  
RADNAY ZOLTÁN

Tel.: 1/246-5631 20/381-0485

Természetesen a pintyek számára készen árusított fonott fészkekben is költhetnek madaraink, de egy megfelelő odú több helyet és nagyobb nyugalmat biztosít a fiókáknak és szüleiknek is.

A fészkek elkészítésének nehezebb munkáját, vagyis a fészkekanyag behordását a hím végzi, amit a tojó rendez el saját ízlésének megfelelően. Nem minden pár kezd egyformán jól a fészkeképítést, vannak, amelyeknek mi kell hogy berakjuk az első adagot az odúba, és ennek hatására kezdik el rendezni, elkészíteni a fészkiüket.

Az elkészült fészkekbe a tojó 1-2 naponként rakja le a tojásokat. Egy fészkealj 4-8 tojásból áll. Általában a negyedik tojás lerakásakor kezdik el folyamatosan ülni azokat. Napközben a hím lelkesen segít párjának a költésben és rendszeresen felváltja a tojót, éjszakára mindig a tojó marad a fészkekben, általában egyedül.

Az első fióka kb. a 15. napon kel ki a tojásból, amit a fészkekből kihallatszó halk, tücsökciripeléshez hasonló hang jelez. A következő napokban követi őt a többi fióka is, melyek kicsik, rózsaszínűek, és teljesen csupaszok. Jellemzőjük a csőrük két sarkában látható fényvisszaverő pontok.

Az első fióka kikelésekor kezdjük el a szülőknél a lágyeleség adagolását, vigyázva annak minőségére és mennyiségére.

Nappal a pár felváltva kotlik éjszakára a tojó marad a fiókákkal. Az első héten a madárkák rohamtempóban növekednek, néha úgy látszik, mintha naponta megduplázódna a méretük. Etetés után a nyakuk kék oldalán jól látható a begyük és vékonyka bő-

rükön át szinte a magok is kivehetőek. 7-8 napos korukra a szárnyaikon megjelennek az első tollak és 11-12 naposan már a tojó is magukra hagyja éjszakára a fiókákat. Ekkor van jelentősége a megfelelő méretű odúnak, mert tapasztalataink szerint a kisebb fészkekben szorongó kicsinyeket hamarabb egyedül hagyja éjszakára a tojó. Ebben az időszakban különösen fontos a környezetük hőmérséklete, mert a fiókák nagyon kevés tollal rendelkeznek, így igénylik a megfelelő hőmérsékletet.

Az első fióka 19-20 nap után hagyja el a fészket, majd 1-2 napon belül követik testvérei is. Megfigyeltük, hogy nem feltétlenül a legidősebb fióka repül ki elsőnek a fészkekből. A fiókák kirepülés után pár napig még visszajárnak az odúba, különösen éjszakára, de egy fészkealjban belül is változhat ez, mert vannak madarak, melyek első naptól a fészken kívül alszanak.

A szülők ezután 15-20 napig etetik a kicsiket, miközben a tojó lerakja a következő fészkealj tojásait.

Ekkor a kicsiket már alig etetik a szülők és eljön az elválasztás ideje. Ha nem akarjuk, hogy a szülők újabb fészkealjat kezdjenek nevelni, vagy a második költés utáni pihenőjük következik, akkor időben vegyük el az odút a pártól, hogy abbahagyják a tojásrakást. Nálunk a madarak évente két fészkealjat nevelnek fel, utána pihenőidejüket töltik.

*Írta és fényképezte:  
Jakab Szabolcs  
Budapest*